

Plats för död i förhållande till vad patienten önskat sig

Martina Rasch Westin (Överläkare), Maria Helde Frankling (Överläkare, Doktorand), Linda Björkhem Bergman (Överläkare, Docent)

ASIH Stockholm Södra, Bergtallsvägen 12, 125 59 Älvsjö och Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

Studiens syfte:

Syftet med studien var att undersöka plats för död i förhållande till vad patienten önskat sig och vilka faktorer som påverkar var patienten avlider.

Bakgrund

Allmänt

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ger svårt sjuka patienter möjlighet att vårdas i hemmet till livets slut. Tidigare studier har visat att många vill dö i sitt hem och att olika faktorer kan påverka patienters val av var de vill tillbringa sin sista tid i livet.

Metod

Retrospektivt har journalerna för alla patienter som avled inom ASIH Stockholm Södra 2017 identifierats (n=457).

Insamlade data

Information om olika demografiska fakta, sjukdomsrelaterade faktorer och önskemål om dödsplats har noterats. Univariat och binär logistisk regressionsanalys har använts.



EPN: Dnr2018/1798-31


Finansiering: ALF, Cancerfonden och Stockholm Sjukhems jubileumsfond

Publikation: Rasch-Westin M, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L, Death at home: predictive factors in a medical home care unit. *BMJ Support Palliat Care*. 2020


Martina Rasch Westin, Maria Helde Frankling och Linda Björkhem Bergman
ASIH Stockholm Södra,
Bergtallsvägen 12, 125 59 Älvsjö
08-123 477 00

Hur många av patienterna dog där de önskade?


Patienter som önskat att få dö på Palliativa avd, n=38



Patienter som önskat att få dö hemma, n=116



Vilka faktorer påverkar plats för död?



Sammanfattning

I denna studie har vi undersökt plats för död i förhållande till patientens önskemål samt faktorer som påverkar var patienten avlider. Majoriteten av alla patienter fick dö där de önskade. Studien understryker vikten av att fråga patienterna var de vill vara vid livets slut, då det var den främsta prognostiska faktorn för plats för död.

Resultat

Önskad plats för död

154 patienter (n=154, 34%) hade en dokumenterad önskan om dödsplats. Majoriteten av dessa (75%, n=116) hade önskat att dö hemma och 80 % (n=123) av patienterna som hade uttryckt en önskan om dödsplats fick sin önskan uppfylld.

Faktorer som påverkar plats för död

Sannolikheten att få dö hemma var oberoende av kön, diagnos, civilstånd, svenskspråkighet, teamtillhörighet eller tillgång till hemtjänst.

En uttalad önskan om att dö hemma var den enda faktorn som var signifikant associerad med död i hemmet ($p < 0.001$).

Slutsats

Majoriteten av patienterna fick dö på den plats de själva önskat. Studien understryker vikten av att fråga patienterna var de vill vara vid livets slut, då det är den främsta prognostiska faktorn för plats för död.



Karolinska
Institutet

ASIH Stockholm Södra
REGION STOCKHOLM